

Mund-og klovsyge

Kvæg

Kvæg - kliniske symptomer kan omfatte

- Smasken
- Savlen
- Sår eller blærer på tungen
- Sår eller blærer i mundhulen
- Sår eller blærer i klovspalten
- Sår eller blærer på patterne
- Reduceret mælkeydelse.

Inkubationstid – Hvornår er dyrene smittefarlige?

Inkubationstiden (fra smitte til symptomer) varer normalt 2-8 dage.

Dyr kan udskille virus op til 4 dage før symptomerne viser sig.

Halvdelen af smittede dyr bærer virus i op til 9 måneder, enkelte i op til 2 år.

Smitteveje – Hvordan spreder sygdommen sig?

1. Direkte kontakt: Virus overføres let fra dyr til dyr.

2. Sekreter: Virus findes i spyt, savl, mælk, sæd, gødning og urin.

Sæd kan være smitsomt før symptomer, og kunstig insemination kan sprede smitte.

Mælk fra smittede dyr kan smitte både afkom og andre besætninger via mælketankbiler.

- Virus kan overleve i luften i flere timer og spredes over store afstande med vinden. Risikoen er størst i tåget og fugtigt vejr, mens virus inaktiveres hurtigt, når luftfugtigheden er under 60 %.
- Mennesker kan bringe virus videre via tøj, huden eller luftvejene.
- Transportmidler og udstyr, der har været i kontakt med smittede dyr, kan sprede virus til andre dyr.

Forebyggelse

- Begræns kontakt mellem dine dyr og andre dyr eller mennesker, der har været i kontakt med smittede besætninger.
- Sørg for grundig rengøring og desinfektion af transportmidler, tøj og udstyr – vi anbefaler 48 timers karantæne for medarbejdere der har været i udlandet inden de arbejder på bedriften igen.
- Hold øje med symptomer som blæredannelse og reager hurtigt ved mistanke om smitte.
- Undgå at jægere tager kød, trofæer og udstyr med fra udlandet til Danmark til smitteopsporingen er afsluttet.
- Reager straks ved mistanke om smitte – det kan redde din besætning fra alvorlige konsekvenser.

Mund- og klovsyge er konstateret i Tyskland. Læs her hvad du skal være opmærksom på.

